



ENS Marais tourbeux du Bois de Valence - Expertise flore et végétation : identification et hiérarchisation des enjeux

Laurent L. Azuelos

► To cite this version:

Laurent L. Azuelos. ENS Marais tourbeux du Bois de Valence - Expertise flore et végétation : identification et hiérarchisation des enjeux. [Rapport Technique] CBNBP – Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. 2022. mnhn-03608941


HAL Id: mnhn-03608941

<https://mnhn.hal.science/mnhn-03608941>

Submitted on 15 Mar 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



ENS Marais tourbeux du Bois de Valence

Expertise flore et végétation
Identification et hiérarchisation
des enjeux

Mars 2022

SENSIBILISER



CONSERVER



ACCOMPAGNER



CONNAÎTRE



Changement climatique



BASSIN PARISIEN



SEINE & MARNE
LE DÉPARTEMENT



ENS Marais tourbeux du Bois de Valence

Expertise flore et végétation

Identification et hiérarchisation des enjeux

Mai 2021

Ce document a été réalisé par le Conservatoire botanique national,
du Bassin parisien, délégation Centre, sous la responsabilité de :

Frédéric Hendoux, directeur du Conservatoire
Conservatoire botanique national du Bassin Parisien
Muséum national d'Histoire naturelle
61 rue Buffon CP 53, 75005 Paris Cedex 05
Tel. : 01 40 79 35 54 – Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : cbnbp@mnhn.fr

Sébastien Filoche, Responsable de la délégation Ile-de-France
Conservatoire botanique national du Bassin Parisien
Muséum national d'Histoire naturelle
61 rue Buffon CP 53, 75005 Paris Cedex 05
Tel. : 01 40 79 35 54 - Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : filoche@mnhn.fr

Inventaire de terrain : Laurent Azuelos
Rédaction et mise en page : Laurent Azuelos
Cartographie : Marlène Toulet et Laurent Azuelos
Gestion des données, analyse : Laurent Azuelos
Saisie des données : Laurent Azuelos


Le partenaire de cette étude est :
Service Sites et Réseaux Naturels
Département de Seine-et-Marne
Direction de l'Eau et de l'Environnement
Hôtel du Département - CS 50377 - 77010 MELUN CEDEX

Référence à utiliser

Azuolos Laurent, 2021 – Expertise de l'ENS Marais tourbeux du Bois de Valence. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, Conseil départemental de Seine-et-Marne. Paris. 35p.

Crédit photo

Photo de couverture : Bas marais alcalin menacé par la dynamique naturelle - © MNHN-CBNBP L. Azuelos - 2020



Sommaire

Résumé.....	p.4
1. L'ENS au sein du réseau départemental des ENS.....	p.5
2. Bilan Flore.....	p.6
3. Bilan Habitat.....	p.8
4. Secteur à enjeux.....	p.14
5. Suivi photographique.....	p.16
Conclusion.....	p.20
Annexe - Liste des espèces végétales.....	p.21

Résumé

L'ENS du Marais tourbeux du Bois de Valence représente un massif forestier de 175 hectares où se démarque **2 hectares de zones humides ouvertes remarquables** réparties principalement entre bas marais alcalin, prairies humides et cariçaies des sols tourbeux (cladiaie).

Compte tenu du contexte géologique original et de ses communautés végétales spécifiques au sein de la Brie humide, cet ENS représente une entité indépendante isolée, sans trame bleue particulière.

Les zones humides ouvertes du Marais tourbeux du Bois de Valence constituent un véritable **réservoir de biodiversité** puisqu'elles abritent **26 espèces végétales extrêmement rares à rares**. Parmi celles-ci, **12 espèces** sont **menacées en Ile-de-France** dont la Laîche blonde, en danger critique.

Parmi les zones humides inventoriées, les **bas marais alcalins et les prairies humides** sont des végétations déterminantes ZNIEFF Île-de-France à **très forte patrimonialité** et devenues extrêmement rares dans notre région qu'il convient de conserver en urgence.

Aussi, l'évaluation du réseau des ENS réalisé par le CBNBP en 2015 avait déjà souligné **l'enjeu départemental lié au patrimoine végétal exceptionnel du Marais tourbeux du Bois de Valence**.

En l'absence de gestion, la majorité des zones ouvertes sont menacées à très court terme par la dynamique naturelle et fait place aux fourrés. **Le maintien des zones humides ouvertes** constitue **l'objectif de gestion prioritaire** du site.

Le Département détient une forte responsabilité pour conserver, sauvegarder un patrimoine végétal à forts enjeux et préserver insectes, micromammifères, oiseaux inféodés à ces zones humides.

1. L'ENS au sein du réseau départemental des ENS

En 2015, le CBNBP a contribué à la révision du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles de Seine-et-Marne (Azuelos *et al*, 2015). Cette étude a notamment permis d'évaluer le réseau des 95 ENS valides (source SI-CD77 : *ENS_valide*), d'identifier 11 ENS d'enjeu départemental et 17 ENS d'enjeu région naturelle.

Cette évaluation souligne que la diversité végétale de l'ENS Marais tourbeux du Bois de Valence présente un enjeu départemental. Au sein du réseau des ENS, le Marais tourbeux du Bois de Valence est classé 6^{ème}/ 95. Il est également **l'un des sites les plus remarquable de la petite région naturelle de la Brie humide.**

Le Département détient donc une responsabilité forte au sein de l'ENS Marais tourbeux du Bois de Valence pour la conservation de ses **12 espèces végétales menacées** et de ses **8 types de végétation déterminant ZNIEFF** en Île-de-France.

Photo de la Laïche puce - *Carex pulicaris*,

Espèce en danger et extrêmement rare en Ile-de-France au sein d'un

Bas-marais alcalin, végétation déterminante ZNIEFF à très forte patrimonialité

En voie de disparition au niveau départemental, régional et nationale.



2. Bilan Flore

D'après les données disponibles sur la base de données *FLORA* du CBNBP et les inventaires réalisés par le CBNBP le 24 juin 2020, **224 espèces végétales** ont été inventoriées sur l'ENS Marais tourbeux du Bois de Valence.

La liste complète des espèces végétales recensées est en annexe.

Cet ENS constitue un réservoir biologique majeur et incontournable pour les zones humides et tout particulièrement pour les bas marais alcalins. En effet, la synthèse floristique révèle la présence de **21 espèces déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France** et **26 espèces extrêmement rares à rares en Île-de-France** :

- 4 espèces extrêmement rares ;
- 15 espèces très rares ;
- 7 espèces rares.

Parmi celles-ci, **12 espèces** sont **menacées en Île-de-France** :

- 1 espèce en **danger critique** : la **Laîche blonde** (*Carex hostiana*) **découverte en 2020** ;
- 6 espèces en danger et 5 espèces vulnérables.


La carte des enjeux flore ci-après précise leur répartition.

Tableau n°1 : Liste des espèces végétales menacées en Ile-de-France présentes sur l'ENS

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Rareté	LRR	ZNIEFF
<i>Carex hostiana</i>	Laîche blonde	2020	RRR	CR	X
<i>Carex pulicaris</i>	Laîche puce	2020	RRR	EN	X
<i>Dactylorhiza incarnata subsp. Incarnata</i>	Orchis couleur de chair	2003	RRR	EN	-
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Gentiane des marais	2014	RR	EN	X
<i>Lysimachia tenella</i>	Mouron délicat	2020	RR	EN	X
<i>Myosurus minimus</i>	Queue-de-souris naine	2014	RR	EN	X
<i>Valeriana dioica subsp. Dioica</i>	Valériane dioïque	2020	RR	EN	-
<i>Cirsium dissectum</i>	Cirse des prairies	2000	RR	VU	X
<i>Epipactis palustris</i>	Épipactis des marais	2003	RR	VU	X
<i>Oenanthe lachenalii</i>	Oenanthe de Lachenal	2020	RR	VU	X
<i>Schoenus nigricans</i>	Choin noirâtre	2020	RRR	VU	X
<i>Scorzonera humilis</i>	Scorsonère des prés	2020	RR	VU	X



Carte des enjeux flore ENS Marais tourbeux du Bois de Valence



3. Bilan Habitat

Les **175 hectares** de l'ENS Marais tourbeux du Bois de Valence ont été identifiés et cartographiés, *in-situ* et *ex-situ*, par le CBNBP dans le cadre de la cartographie des végétations du département de Seine-et-Marne entre 2006 et 2011. Le passage du CBNBP au cours de la saison 2020 a permis de préciser la nature et l'état de conservation des milieux ouverts.

Selon l'état de nos connaissances actuelles, 14 types de végétation ont été recensés sur le site. La carte des végétations, ci-après, permet d'apprécier leur répartition.

La caractéristique et les secteurs à enjeux de cet ENS se concentrent sur les **deux hectares de milieux ouverts répartis entre bas marais, prairies humides et cariçaies des sols tourbeux (cladiaies)**. Ces **habitats d'espèces menacées** sont des **végétations déterminantes ZNIEFF Île-de-France à très forte patrimonialité**.

Cependant, l'absence de gestion de l'ENS occasionne leur fermeture progressive. Ces milieux ouverts sont tous menacés à court terme par la dynamique naturelle. Les **fourrés humides** les supplantent progressivement. Ces derniers sont largement majoritaires au sein des espaces ouverts et témoignent donc de la trajectoire défavorable du site.

Le maintien des zones humides ouvertes constitue l'objectif de gestion prioritaire pour ce site. Elles recouvrent environ 1% de la surface de l'ENS. Le reste est occupé par des milieux fermés dont 14% de forêts et fourrés humides.

Représentation de la surface des végétations de l'ENS Marais tourbeux du Bois de Valence




Tableau de synthèse des végétations de l'ENS Marais tourbeux du Bois de Valence :

Correspondances typologiques, patrimonialité et surfaces

Syntaxons	Nom français	Corine Biotopes	Code EUNIS	Code Natura 2000	ZNIEFF IdF	Fiche Atlas77	Surface ha
SYSTÈME HYGROPHILE À MÉSOHYGROPHILE							26,7
Bas marais et prairies humides							1,7
<i>Dactylorhiza praetermissae</i> - <i>Molinietum caeruleae</i>	Prairie à Molinie et Orchis négligé sur calcaire	37.311	E3.511	6410	Oui	33	0,7
<i>Hydrocotylo vulgaris</i> - <i>Schoenion nigricantis</i>	Bas-marais alcalin	54.2	D4.1	7230	Oui	10	0,3
<i>Molinion caeruleae</i>	Prairie à Molinie sur calcaire	37.311	E3.511	6410	Oui	33	0,7
Roselières et cariçaies							0,4
<i>Carici pseudocyperis</i> - <i>Rumicion hydrolapathi</i>	Cariçaies des sols vaseux	53.218	D5.218	-	Oui	24	0,06
<i>Cladietum marisci</i>	Cladiaies des bas-marais	53.31	D5.24	7210-1	Oui	22	0,1
<i>Oenanthion aquaticae</i> / <i>Oenanthe aquaticae</i> - <i>Rorippetum amphibiae</i>	Roselière basse / Roselière basse à Oenanthe aquatique et Rorripe amphibie	53.14	C3.24	-	Oui	21	0,2

Syntaxons	Nom français	Corine Biotopes	Code EUNIS	Code Natura 2000	ZNIEFF IdF	Fiche Atlas77	Surface ha
SYSTÈME HYGROPHILE À MÉSOHYGROPHILE							26,7
Fourrés humides							10,6
<i>Frangulo alni - Salicetum cinereae</i>	Saulaie marécageuse à Saule à oreillettes	44.921	F9.21	-	Oui	63	7,2
<i>Rhamno catharticae - Viburnetum opuli</i>	Fourré humide à Nerpun purgatif et Viorne obier	31.81	F3.111	-	Non	62	0,06
<i>Salici cinereae - Rhamnion catharticae</i>	Fourré humide	31.811	F3.111	-	Non	62	3,3
Forêt humide							14
<i>Carici flacca - Quercetum roboris</i>	Chênaie pédonculée à Laïche glauque	41.22	G1.A12	-	Non	68	14
SYSTÈME MÉSOPHILE							148
Prairie mésophile							0,9
<i>Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris</i>	Prairie de fauche neutro-basiphile	38.22	E2.221	6510	Oui	35	0,9
Trouées forestières : végétation herbacée et fourré							3,1
<i>Epilobion angustifolii</i>	Clairière à Epilobes et Digitales	31.8711	G5.841	-	Non	53	3
<i>Pruno spinosae - Rubion radulae</i>	Ronciers acidiclins	31.83	F3.13	-	Non	59	0,1

Syntaxons	Nom français	Corine Biotopes	Code EUNIS	Code Natura 2000	ZNIEFF IdF	Fiche Atlas77	Surface ha
SYSTÈME MÉSOPHILE							148
Forêt mésophile							144
<i>Quercenion robori – pyrenaicae</i> / <i>Sorbo torminalis - Quercetum petraeae</i>	Chênaies acidiphiles thermo-atlantiques / Chênaie sessiliflore à Alisier torminal	41.54	G1.84	68	Non	68	144

LÉGENDE DE LA CARTE VÉGÉTATIONS - Marais tourbeux Bois de Valence

SYSTÈME HYGROPHILE À MÉSOHYGROPHILE

Bas-marais et prairies humides

Etiquette	Syntaxon phytosociologique	Nom français	N° Fiche Atlas77
DaMo	<i>Dactylorhiza praetermissae</i> - <i>Molinietum caeruleae</i>	Prairie à Molinie et Orchis négligé sur calcaire	33
HySh	<i>Hydrocotylo vulgaris</i> - <i>Schoenion nigricantis</i>	Bas-marais alcalin	10
Moca	<i>Molinion caeruleae</i>	Prairie à Molinie sur calcaire	33

Roselières et cariçaies

CaRu	<i>Carici pseudocyperi</i> - <i>Rumicion hydrolapathi</i>	Cariçaie des sols vaseux non consolidés	24
Clma	<i>Cladietum marisci</i>	Cladiaie	22
Oeaq	<i>Oenanthon aquaticae</i>	Roselière basse	21
OeRo	<i>Oenanthon aquaticae</i> - <i>Rorippetum amphibiae</i>	Roselière basse à Œnanthe aquatique et Rorripe amphibie	21

Fourrés et forêt humides

FrSa	<i>Frangulo alni</i> - <i>Salicetum auritae</i>	Saulaie marécageuse à Saule à oreillettes	63
RhVi	<i>Rhamno catharticae</i> - <i>Viburnetum opuli</i>	Fourré humide à Nerpun et Viorne obier	62
SaRh	<i>Salici cinereae</i> - <i>Rhamnion catharticae</i>	Fourré humide	62
CaQu	<i>Carici flacca</i> - <i>Quercetum roboris</i>	Chênaie pédonculée à Laîche glauque	68

SYSTÈME MÉSOPHILE À MÉSOHYGROPHILE

Prairies mésophiles

TrAr	<i>Trifolium montani</i> - <i>Arrhenatherenion</i>	Prairie de fauche neutro-basiphile	35
-------------	--	------------------------------------	----


Trouées forestières herbacées et fourrés

Epan	<i>Epilobion angustifolii</i>	Clairière à Epilobes et Digitales	53
PrRur	<i>Pruno spinosae</i> - <i>Rubion radulae</i>	Ronciers acidoclinaux	59

Forêts mésophiles

Qupy	<i>Quercenion robori</i> - <i>pyrenaicae</i>	Chênaies acidiphiles thermo-atlantiques	68
SotQu	<i>Sorbo torminalis</i> - <i>Quercetum petraeae</i>	Chênaie sessiliflore à Alisier torminal	

Carte des végétations ENS Marais tourbeux du Bois de Valence



Expertise de l'ENS Marais tourbeux du Bois de Valence
Laurent Azuelos CBNBP/MNHN – Mars 2022

4. Secteurs à enjeux

La répartition des espèces menacées et des végétations déterminantes ZNIEFF IdF permet d'identifier les secteurs à enjeux.

Les secteurs à enjeux de cet ENS se concentrent prioritairement sur les **deux hectares de milieux ouverts répartis entre bas marais alcalin, prairies humides et cariçaies des sols tourbeux (cladiaies)**. Ces **végétations déterminantes ZNIEFF Île-de-France** possèdent une **très forte patrimonialité**. Elles sont devenues **extrêmement rares** dans notre région et abritent une **flore exceptionnelle**, souvent exclusives à ces milieux. Ces végétations sont très sensibles aux dégradations de leur milieu à l'abandon des pratiques agro-pastorales. Il convient de les **conserver en urgence**.


Les **cariçaies des sols vaseux et les roselières basses** sont aussi déterminantes ZNIEFF Ile-de-France mais sont beaucoup moins menacées.

Toutes ces végétations présentent un **intérêt fonctionnel et écologique majeur** au sein des zones humides oligotrophes alcalines : autoépuration des eaux, rétention des inondations et zones refuge pour de nombreuses espèces animales.


Ces zones humides ouvertes restent **fragmentées** au sein du massif forestier, en mosaïque avec des fourrés humides ou ponctuel mais systématiquement **menacées par la dynamique végétale**.

La saulaie marécageuse à Saule à oreillettes est un fourré humide **également déterminant ZNIEFF en Ile-de-France**. Elle joue un rôle important d'abri et de zone de reproduction pour la faune côtoyant ces milieux. Il est important de veiller à **limiter leur développement** afin de maintenir la diversité des milieux ouverts des marais d'un intérêt patrimonial supérieur.

La prairie mésophile fauchée est aussi **déterminante ZNIEFF en Ile-de-France**. Elle offre potentiellement une floraison spectaculaire au printemps et représente une source vitale de nectar et de pollen pour les insectes. Elle peut servir de terrain de chasse à de nombreux prédateurs.



4. Suivi photographique



1 - Prairie à Molinie sur calcaire colonisé par un fourré humide



1 - Prairie à Molinie sur calcaire colonisé par un fourré humide



1 - Cladiaie colonisée par un fourré humide



2 - Prairie à Molinie sur calcaire colonisé par une Saulaie marécageuse à Saule à oreillettes



3 – Bas marais alcalin colonisé par un fourré humide



Conclusion

La diversité végétale de l'ENS du Marais tourbeux du Bois de Valence représente un **enjeu départemental**. En effet, le **Département détient une responsabilité** forte pour y maintenir et restaurer les zones humides ouvertes abritant **12 espèces végétales menacées et 8 types de végétation déterminant ZNIEFF** en Île-de-France.

Bien que très fragmentés au sein de l'ENS, les bas marais alcalin, prairies humides et cariçaies des sols tourbeux (cladiaies) possèdent une **richesse floristique exceptionnelle** et constituent un refuge pour de nombreuses espèces animales.

Les bas-marais alcalins sont en voie de disparition au niveau départemental, régional et national. L'abandon des pratiques agro-pastorales leur est néfaste et conduit actuellement à l'embroussaillage du milieu.

Les milieux tourbeux encore présent sur l'ENS doivent être restaurés en priorité.

Les prairies humides relictuelles et cladiaies jouent un rôle fonctionnel fort au sein des zones humides oligotrophes alcalines (filtration, épuration et rétention des eaux d'inondations), hébergent de nombreuses espèces patrimoniales et constitue un refuge pour de nombreuses espèces animales.

Il est donc **urgent de mettre en place une gestion adaptée sur l'ENS afin de gérer et restaurer les zones humides ouvertes qui disparaissent sous les fourrés**.

ANNEXE

Liste des espèces végétales
ENS Marais tourbeux du Bois de Valence

Extraction Base de données FLORA 2020 et inventaire 2020

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat	Rareté	LRR	ZNIEFF
<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore	2011	Eurynaturalisé	CCC	NA	-
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Aethusa cynapium</i> L., 1753	Petite cigüe	2014	Indigène	C	LC	-
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	2006	Indigène	CCC	LC	-
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	2018	Indigène	CC	LC	-
<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	Vulpin genouillé	2006	Indigène	AR	LC	-
<i>Alopecurus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés	2014	Indigène	C	LC	-
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	Anémone des boi	2018	Indigène	CC	LC	-
<i>Angelica sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> L., 1753	Angélique sauvage	2020	Indigène	CC	LC	-
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Alchémille des champs	2014	Indigène	C	LC	-
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	Bardane à petites têtes	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Argentina anserina</i> subsp. <i>anserina</i> (L.) Rydb., 1899	Potentille des oies	2014	A définir	.	NA	-
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle	2011	Indigène	C	LC	-
<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv., 1805	-	2018	-	-	-	-
<i>Avenella flexuosa</i> subsp. <i>flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	Foin tortueux	2006	Indigène	C	LC	-
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bouleau blanc	2014	Indigène	C	LC	-
<i>Brachypodium rupestre</i> subsp. <i>rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode des rochers	2020	Indigène	CC	LC	-
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	2014	Indigène	CCC	LC	-

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat	Rareté	LRR	ZNIEFF
<i>Calamagrostis epigejos</i> subsp. <i>epigejos</i> (L.) Roth, 1788	Calamagrostide épigéios	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	Callitriche des marais	2000	Indigène	AC	LC	-
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune	2018	Indigène	C	LC	-
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	Laîche des marais	2011	Indigène	C	LC	-
<i>Carex distans</i> L., 1759	Laîche à épis distants	2014	Indigène	RR	NT	X
<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	Laîche distique	2014	Indigène	R	NT	X
<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	Laîche écartée	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Carex elata</i> subsp. <i>elata</i> All., 1785	Laîche raide	2020	Indigène	AR	LC	-
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771	Langue-de-pic	2020	Indigène	CC	LC	-
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laîche hérissée	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	Laîche blonde	2020	Indigène	RRR	CR	X
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	Laîche écailleuse	2020	Indigène	RR	LC	X
<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laîche pâle	2014	Indigène	AC	LC	-
<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laîche millet	2020	Indigène	R	LC	X
<i>Carex paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i> L., 1755	Laîche paniculée	2014	Indigène	AR	LC	-
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laîche à épis pendants	2018	Indigène	C	LC	-
<i>Carex pilulifera</i> subsp. <i>pilulifera</i> L., 1753	Laîche à pilules	2014	Indigène	C	LC	-
<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	Laîche faux-souchet	2011	Indigène	AC	LC	-
<i>Carex pulcaris</i> L., 1753	Laîche puce	2020	Indigène	RRR	EN	X
<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Laîche des rives	2014	Indigène	C	LC	-
<i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> Huds., 1762	Laîche des bois	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	Laîche tomenteuse	2014	Indigène	R	LC	X
<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laîche vésiculeuse	2011	Indigène	AR	LC	-
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Chataignier	2018	Indigène	CC	LC	-
<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	Cornifle nageant	2000	Indigène	AC	LC	-
<i>Chara contraria</i> A.Braun ex Kütz., 1845	-	2014	-	-	-	-
<i>Chara vulgaris</i> L., 1753	-	2014	-	-	-	-
<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	Cirse des prairies	2000	Indigène	RR	VU	X
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais	2020	Indigène	CC	LC	-
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Marisque	2014	Indigène	RR	NT	X
<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Muguet	2015	Indigène	C	LC	-
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier	2018	Indigène	CCC	LC	-

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat	Rareté	LRR	ZNIEFF
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	Néflier	2014	Indigène	AC	LC	-
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753	Pied-de-poule	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis couleur de chair	2003	Indigène	RRR	EN	-
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	Daucus carotte	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse	2013	Indigène	C	LC	-
<i>Dicranum scoparium</i> Hedw., 1801	-	2018	-	-	-	-
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéris des chartreux	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	2020	Indigène	AC	LC	-
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	Scirpe à une écaille	2020	Indigène	RR	LC	-
<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	Épilobe des montagnes	2013	Indigène	C	LC	-
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis des marais	2003	Indigène	RR	VU	X
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs	2020	Indigène	CCC	LC	-
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prêle des marais	2020	Indigène	AC	LC	-
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Bonnet-d'évêque	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	Chanvre d'eau	2020	Indigène	CCC	LC	-
<i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L., 1753	Herbe à la faux	2018	Indigène	CC	LC	-
<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbe petit-cyprès	2014	Indigène	AC	LC	-
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Fouteau	2018	Indigène	CC	LC	-
<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	Fétuque capillaire	2018	Indigène	AC	LC	-
<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	Fétuque hétérophylle	2014	Indigène	AC	LC	-
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire à bulbilles	2018	Indigène	CC	LC	-
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourgène	2020	indigène	C	LC	-
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé	2020	Indigène	CCC	LC	-
<i>Galium album</i> Mill., 1768	Gaillet dressé	2014	Indigène	CCC	DD	-
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	2020	Indigène	C	LC*	-
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet aquatique	2011	Indigène	AR	LC	-
<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers	2011	Indigène	AC	LC	-

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat	Rareté	LRR	ZNIEFF
Gentiana pneumonanthe L., 1753	Gentiane des marais	2014	Indigène	RR	EN	X
Geranium dissectum L., 1755	Géranium découpé	2014	Indigène	CCC	LC	-
Geranium robertianum L., 1753	Herbe à Robert	2018	Indigène	CCC	LC	-
Geum urbanum L., 1753	Benoîte commune	2018	Indigène	CCC	LC	-
Glechoma hederacea L., 1753	Lierre terrestre	2018	Indigène	CCC	LC	-
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810	Glycérie flottante	2006	Indigène	C	LC	-
Hedera helix L., 1753	Lierre grimpant	2018	Indigène	CCC	LC	-
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973	Picride fausse Vipérine	2014	Indigène	CCC	LC	-
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L., 1753	Grande Berce	2018	Indigène	CCC	LC	-
Hieracium umbellatum L., 1753	Épervière en ombelle	2014	Indigène	AC	LC	-
Holcus lanatus subsp. lanatus L., 1753	Houlque laineuse	2014	Indigène	CCC	LC	-
Hydrocotyle vulgaris L., 1753	Écuelle d'eau	2000	Indigène	R	LC	X
Hypericum humifusum L., 1753	Millepertuis couché	2014	Indigène	AC	LC	-
Hypericum perforatum L., 1753	Millepertuis perforé	2014	Indigène	CCC	LC	-
Hypericum pulchrum L., 1753	Millepertuis élégant	2011	Indigène	C	LC	-
Inula salicina L., 1753	Inule à feuilles de saule	2014	Indigène	RR	NT	X
Iris pseudacorus L., 1753	Iris faux acore	2018	Indigène	CC	LC	-
Juncus articulatus subsp. articulatus L., 1753	Jonc à fruits luisants	2006	Indigène	C	LC	-
Juncus bufonius L., 1753	Jonc des crapauds	2014	Indigène	CC	LC	-
Juncus conglomeratus L., 1753	Jonc aggloméré	2007	Indigène	C	LC	-
Juncus effusus L., 1753	Jonc épars	2020	Indigène	CCC	LC	-
Juncus inflexus L., 1753	Jonc glauque	2007	Indigène	CC	LC	-
Juncus subnodulosus Schrank, 1789	Jonc à tépales obtus	2020	Indigène	R	LC	X
Juncus tenuis Willd., 1799	Jonc grêle	2018	Eurynaturalisé	C	NA	-
Juniperus communis subsp. communis L., 1753	Genévrier commun	2018	Indigène	AR	LC	-
Kickxia elatine subsp. elatine (L.) Dumort., 1827	Kickxia Élatine	2014	Indigène	C	LC	-
Lapsana communis L., 1753	Lampsane commune	2018	Indigène	CCC	LC	-
Leucanthemum vulgare Lam., 1779	Marguerite commune	2014	Indigène	CCC	LC	-
Ligustrum vulgare L., 1753	Troëne	2020	Indigène	CCC	LC	-
Lonicera periclymenum subsp. periclymenum L., 1753	Chèvrefeuille des bois	2018	Indigène	CCC	LC	-
Lonicera xylosteum L., 1753	Chèvrefeuille des haies	2014	Indigène	CC	LC	-
Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806	Luzule de Forster	2014	Indigène	C	LC	-
Luzula multiflora subsp. multiflora (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore	2014	Indigène	C	DD	-

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat	Rareté	LRR	ZNIEFF
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	Luzule de printemps	2018	Indigène	AC	LC	-
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycophe d'Europe	2018	Indigène	CC	LC	-
<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	Mouron délicat	2020	Indigène	RR	EN	X
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimaque commune	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	2020	Indigène	CC	LC	-
<i>Mnium hornum</i> Hedw., 1801	-	2018	-	-	-	-
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	2020	Indigène	AC	LC	-
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	Stellaire aquatique	2011	Indigène	C	LC	-
<i>Myosurus minimus</i> L., 1753	Queue-de-souris naine	2014	Indigène	RR	EN	X
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	Oenanthe phellandre	2018	Indigène	AR	LC	-
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	Oenanthe de Lachenal	2020	Indigène	RR	VU	X
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	Panais cultivé	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	Peucédan de France	2006	Indigène	R	LC	X
<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i> L., 1753	Fromenteau	2020	Indigène	CC	LC	-
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau	2020	Indigène	CC	LC	-
<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>hieracioides</i> L., 1753	Herbe aux vermisseeux	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Pin sylvestre	2018	Eurynaturalisé	C	NA	-
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Plantago major</i> subsp. <i>pleiosperma</i> Pilg., 1937	Plantain intermédiaire	2014	Indigène	AC	LC	-
<i>Poa annua</i> subsp. <i>annua</i> L., 1753	Pâturin annuel	2014	indigène	CCC?	LC	-
<i>Poa nemoralis</i> subsp. <i>nemoralis</i> L., 1753	Pâturin des bois	2007	Indigène	CCC	LC	-
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon multiflore	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	Polypode intermédiaire	2018	Indigène	C	LC	-
<i>Polytrichum formosum</i> Hedw., 1801	-	2018	-	-	-	-
<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier Tremble	2020	Indigène	CCC	LC	-
<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804	Peuplier grisard	2020	Eurynaturalisé	C	NA	-

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat	Rareté	LRR	ZNIEFF
Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797	Potentille tormentille	2011	Indigène	C	LC	-
Potentilla reptans L., 1753	Potentille rampante	2018	Indigène	CCC	LC	-
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856	Potentille faux fraisier	2018	Indigène	CC	LC	-
Primula veris subsp. veris L., 1753	Coucou	2018	Indigène	CC	LC	-
Prunella vulgaris L., 1753	Brunelle commune	2014	Indigène	CCC	LC	-
Prunus avium (L.) L., 1755	Merisier vrai	2014	Indigène	CCC	LC	-
Prunus laurocerasus L., 1753	Laurier-cerise	2018	Eurynaturalisé	AC	NA	-
Prunus mahaleb L., 1753	Bois de Sainte-Lucie	2011	Indigène	C	LC	-
Prunus spinosa L., 1753	Épine noire	2018	Indigène	CCC	LC	-
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle	2000	Indigène	C	LC	-
Pulmonaria longifolia subsp. longifolia (Bastard) Boreau, 1857	Pulmonaire à feuilles longues	2014	Indigène	AR	LC	-
Pyrus communis subsp. pyraeaster (L.) Ehrh., 1780	Poirier sauvage	2011	Indigène	R?	DD	-
Quercus petraea subsp. petraea Liebl., 1784	Chêne à trochets	2014	Indigène	CCC	LC	-
Quercus robur L., 1753	Chêne pédonculé	2020	Indigène	CCC	LC	-
Quercus rubra L., 1753	Chêne rouge d'Amérique	2018	Subspontané	.	NA	-
Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme, 1863	Renoncule âcre	2014	Indigène	CCC	LC	-
Ranunculus auricomus L., 1753	Renoncule à tête d'or	2018	Indigène	C	LC	-
Ranunculus flammula L., 1753	Renoncule flammette	2018	Indigène	AC	LC	-
Ranunculus repens L., 1753	Renoncule rampante	2014	Indigène	CCC	LC	-
Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus Chaix, 1785	Renoncule de Drouet	2000	Indigène	RR	NT	-
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., 1906	-	2018	-	-	-	-
Ribes rubrum L., 1753	Groseillier rouge	2011	Indigène	CC	LC	-
Robinia pseudoacacia L., 1753	Robinier faux-acacia	2018	Eurynaturalisé	CCC	NA	-
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821	Rorippe amphibie	2018	Indigène	C	LC	-
Rosa arvensis Huds., 1762	Rosier des champs	2014	Indigène	CCC	LC	-
Rosa subsect. caninae (Groupe)	Rosier des chiens	2000	Indigène	CCC	NA	-
Rubus caesius L., 1753	Rosier bleue	2014	Indigène	CCC	LC	-
Rubus fruticosus agg. (Groupe)	Rosier	2014	Indigène	CCC	LC	-
Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753	Rumex oseille	2014	Indigène	CC	LC	-
Rumex obtusifolius L., 1753	Patience à feuilles obtuses	2014	Indigène	CCC	LC	-
Salix alba L., 1753	Saule blanc	2006	Indigène	CC	LC	-

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat	Rareté	LRR	ZNIEFF
<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule à feuilles d'Olivier	2020	Indigène	AC	LC	-
<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	2020	Indigène	CC	LC	-
<i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque faux-roseau	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre	2020	Indigène	RRR	VU	X
<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	Scille à deux feuilles	2018	Indigène	RR	LC	X
<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés	2020	Indigène	RR	VU	X
<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>auriculata</i> L., 1753	Scrophulaire à oreillettes	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrophulaire noueuse	2006	Indigène	CC	LC	-
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	Silaüs des prés	2014	Indigène	AC	LC	-
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	Compagnon blanc	2014	A définir	.	NA	-
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Herbe aux chantres	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Douce amère	2020	Indigène	CCC	LC	-
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron piquant	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier des bois	2014	Indigène	C	LC	-
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des bois	2006	Indigène	CCC	LC	-
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés	2014	Indigène	AC	LC	-
<i>Taraxacum ruderalia</i> (Groupe)	Pissenlit	2014	Indigène	CC	NA	-
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée	2018	Indigène	CC	LC	-
<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp., 1852	-	2018	-	-	-	-
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles	2006	Indigène	CC	LC	-
<i>Tranzschelia anemones</i> (Pers.) Nannf.	-	2017	-	-	-	-
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage	2000	Indigène	CC	LC	-
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque	2018	Indigène	CCC	LC	-
<i>Valeriana dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753	Valériane dioïque	2020	Indigène	RR	EN	-
<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (J.C.Mikan ex Pohl) Čelak., 1871	Valériane à feuilles de Sureau	2011	Indigène	C	DD	-
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs	2014	Indigène	CCC	LC	-
<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	Véronique à feuilles de lierre	2014	Indigène	CC	LC	-

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat	Rareté	LRR	ZNIEFF
<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale	2018	Indigène	C	LC	-
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse	2014	Eurynaturalisé	CCC	NA	-
<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753	Véronique à feuilles de Serpolet	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier	2020	Indigène	CC	LC	-
<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca	2003	Indigène	CC	LC	-
<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	2014	Indigène	CC	LC	-
<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	Violette de Rivinus	2006	Indigène	CC	LC	-
<i>Viscum album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753	Gui des feuillus	2018	Indigène	CC	LC	-

Pour en savoir plus :

<http://www.cbnbp.mnhn.fr>



Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien est un service scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle, agréé par le ministère de l'environnement.

5 missions spécialisées sur la flore sauvage et les végétations :

- la connaissance ;
- la validation et la gestion durable des données ;
- l'identification et la conservation des éléments rares et menacés ;
- la fourniture d'un concours technique et scientifique auprès des pouvoirs publics ;
- l'information et la sensibilisation du public.

Un agrément national

- Conféré par le ministère en charge de l'environnement et renouvelé à 4 reprises depuis 1998.

Le CBNBP intervient sur un périmètre constitué des régions Centre-Val de Loire, Île-de-France et des départements de l'ex-Bourgogne (région Bourgogne-Franche-Comté) et de l'ex-Champagne-Ardenne (région Grand Est).



Le CBNBP est membre de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux et partenaire de l'Office français pour la biodiversité.

Contacts

Siège et Pôle administratif

Directeur : Frédéric Hendoux
 Directeur scientifique adjoint : Sébastien Filoche
 Responsable administrative et financière : Céline Lemoine
 61 rue Buffon - CP53
 75005 PARIS
 E-mail : cbnbp@mnhn.fr

Délégation Bourgogne

Responsable : Olivier Bardet
 Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
 58230 SAINT-BRISSON
 Tél. : 03 86 78 79 60
 E-mail : cbnbp-bourg@mnhn.fr

Délégation Centre-Val de Loire

Responsable : Jordane Cordier
 DREAL Centre - BP6407
 5 avenue Buffon - 45064 ORLEANS Cedex 2
 Tél. : 02 36 17 41 31
 E-mail : cbnbp-cvl@mnhn.fr

Délégation Champagne-Ardenne

Responsable : François Dehondt
 30 Chaussée du Port - CS 50423
 51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
 Tél. : 03 26 65 28 24
 E-mail : francoisdehondt@mnhn.fr

Délégation Île-de-France

Responsable : Jeanne Vallet
 61 rue Buffon - 75005 PARIS
 Tél. : 01 40 79 56 47
 E-mail : cbnbp-idf@mnhn.fr

Pôle Conservation

Responsable : Philippe Bardin
 Tél. : 01 40 79 56 25
 E-mail : philippe.bardin@mnhn.fr

Pôle Phytosociologie - Habitats

Responsable : Gaël Causse
 Tél. : 03 86 78 79 61
 E-mail : gaelcausse@mnhn.fr

Pôles Système d'information

Responsable : Maëlle Rambaud
 Chef de projet Développement : Silvere Camponovo
 Tél. : 01 40 79 56 49
 E-mail : cbnbp-si@mnhn.fr